

БАЗА ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 297.2

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЗАЩИТЕ ВИНОГРАДА СОРТА ШАРДОНЕ ОТ **ОИДИУМА** С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИФЛОКСИСТРОБИНА И **WETCIT**

КУЛЬТУРА:	Виноград сорта Шардоне (<i>Vitis vinifera</i>)
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:	Оидиум (<i>Uncinula necator</i>)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА:	Куртленд • Калифорния • США
ДАТА:	Апрель 2009
ИССЛЕДОВАТЕЛИ:	В. Дуглас Габлер • Кристофер Н. Янусек • Ян С. Бэй ФАКУЛЬТЕТ ФИТОПАТОЛОГИИ • КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ДЭВИС



КУЛЬТУРА

Виноград сорта Шардоне *Vitis vinifera*



ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оидиум *Uncinula necator*

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Результаты эксперимента с обработками трифлуксистробином и трифлуксистробином с **WETCIT**, представленные в данном документе, являются частью серии экспериментов, проведенных факультетом фитопатологии Калифорнийского университета в Дэвисе в 2009.

В экспериментах была применена система рандомизированного полноблочного плана с пятью повторениями.

Обработки проводились ручным опрыскивателем с нормой расхода рабочей жидкости 935 литров на гектар в период до начала цветения, с увеличением нормы расхода до 1870 литров на гектар в конце разрешенного периода обработок.


ТАБЛИЦА ОБРАБОТОК

	ОБРАБОТКИ	НОРМА РАСХОДА НА ГА	ПЕРИОДИЧНОСТЬ
1	КОНТРОЛЬ		
2	Трифлуксистробин	140 грамм	14 дней
3	Трифлуксистробин + WETCIT	140 грамм 0,25%	14 дней

СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ ОИДИУМОМ ГРОЗДЕЙ ШАРДОНЕ В НАЧАЛЕ СОЗРЕВАНИЯ

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ ОБРАБОТОК С ИНТЕРВАЛОМ В 14 ДНЕЙ, С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ ДО СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ 2009

В. ДУГЛАС ГАБЛЕР • КРИСТОФЕР Н. ЯНУСЕК • ЯН С. БЭЙ
ФАКУЛЬТЕТ ФИТОПАТОЛОГИИ • КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ • ДЭВИС



ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЯ ОИДИУМОМ ГРОЗДЕЙ ШАРДОНЕ В НАЧАЛЕ СОЗРЕВАНИЯ

С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ ОБРАБОТОК С ИНТЕРВАЛОМ В 14 ДНЕЙ, С СЕРЕДИНЫ АПРЕЛЯ ДО СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ 2009

В. ДУГЛАС ГАБЛЕР • КРИСТОФЕР Н. ЯНУСЕК • ЯН С. БЭЙ
ФАКУЛЬТЕТ ФИТОПАТОЛОГИИ • КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ • ДЭВИС

